

VONAU[®]VET

CLORIDRATO DE ONDANSETRONA

5 mg/mL

USO VETERINÁRIO

Antiemético de uso oral para cães

Fórmula

Cada mL de Vonau[®] Vet contém:

cloridrato de ondansetrona di-hidratado5 mg
excipientes q.s.p. 1 mL

*contém aromatizante mentol

Informações técnicas

A ondansetrona é um fármaco antiemético derivado do carbazol e classificada como antagonista de receptores de serotonina do tipo 3 (5-HT₃). Esses receptores estão presentes periféricamente nas terminações do nervo vago, centralmente nos quimiorreceptores da zona de gatilho do vômito e se associam a vários órgãos, principalmente no sistema digestório. A serotonina, que pode ser liberada pelas células enterocromafins no intestino delgado em algumas situações, pode estimular os nervos vagais aferentes por meio dos receptores 5-HT₃ e estimular o reflexo do vômito. O bloqueio dos receptores 5-HT₃ periférica e centralmente, e o bloqueio da ativação de células de liberação de dopamina no núcleo *accumbens* (por meio do antagonismo do receptor 5-HT₃) são possíveis mecanismos do efeito antiemético relacionados à ondansetrona.

Indicações: Vonau[®] Vet é recomendado para a prevenção do vômito em cães.

Posologia e modo de usar

O produto deve ser administrado exclusivamente pela via oral. A dose recomendada é de 0,5 a 1,0 mg/kg a cada 12 horas por até 5 dias, de acordo com a tabela abaixo:

Peso do animal em kg	Vonau [®] Vet 5 mg/mL Dose de 0,5 mg/kg (volume em mL)	Vonau [®] Vet 5 mg/mL Dose de 1,0 mg/kg (volume em mL)
2,5	0,25	0,5
5,0	0,5	1,0
7,5	0,75	1,5
10,0	1,0	2,0
15,0	1,5	3,0
20,0	2,0	4,0
25,0	2,5	5,0
30,0	3,0	6,0

De acordo com estudo realizado em cães, Vonau[®] Vet demonstrou 100% de eficácia na profilaxia de vômitos, quando utilizado na dose de 1,0 mg/kg, e na redução de 91% dos episódios de vômitos, quando empregado na dose de 0,5 mg/kg.

Contraindicações

O produto não deve ser administrado a cães com hipersensibilidade à ondansetrona ou a qualquer componente da fórmula. Recomenda-se o uso da menor dose (0,5 mg/kg) a cães com insuficiência hepática, já que a meia-vida poderá estar prolongada.

Interações medicamentosas

Há evidências de interação clinicamente significativa entre tramadol e ondansetrona, em que a eficácia de cada agente é minimizada na presença do outro agente. O tramadol é um analgésico central dependente da concentração serotoninérgica e a ondansetrona é um antagonista seletivo do receptor 5-HT₃ da serotonina. A administração simultânea desses fármacos pode resultar na redução da eficácia analgésica do tramadol e na diminuição da ação antiemética da ondansetrona. A isoenzima P450 está envolvida no metabolismo do tramadol e da ondansetrona. A competição por essa via metabólica pode resultar na redução da formação do metabolito O-desmetiltramadol (M1) e conseqüentemente na diminuição da eficácia analgésica. Diante disso, recomenda-se evitar a administração dos dois fármacos simultaneamente.

Efeitos adversos

A ondansetrona é bem tolerada. Diante do estudo de segurança realizado, o produto **Vonau® Vet** demonstrou-se seguro para cães quando utilizado nas doses recomendadas.

Precauções

A ondansetrona é um potencial substrato neurotóxico da glicoproteína P, por isso deve ser utilizada com cautela em cães de pastoreio, como collie, pastor-de-shetland e pastor-australiano, pois tais raças podem manifestar mutação genética que expresse proteínas não funcionais. A segurança de **Vonau® Vet** não foi testada em cadelas gestantes ou lactantes, em cães usados para procriação, em cães com obstrução gastrointestinal, nos que ingeriram toxinas nem em cães abaixo de 1 ano de idade.

Intoxicação e superdosagem

Em casos de intoxicação ou superdosagem, procure um médico-veterinário para tratamento de suporte e avaliação. Reações como êmese e fezes pastosas foram observadas em cães que receberam de 3 a 5 vezes a dose máxima terapêutica recomendada.

Advertências

Produtos de uso veterinário devem ser mantidos fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não devem ser armazenados junto de alimentos, bebidas ou produtos de higiene pessoal. O produto não é indicado para cães abaixo de 1 ano de idade, fêmeas prenhes e lactantes pois estudos de segurança não foram realizados nestes grupos. Reações como êmese e fezes pastosas foram observados em animais que receberam de 3 a 5 vezes a dose máxima terapêutica recomendada.

Apresentação

Cartucho de papelão contendo 1 frasco com 10 mL (AMOSTRA GRÁTIS).

Cartucho de papelão contendo 1 frasco plástico com 30 mL.

Contém batoque e seringa dosadora de 3 mL. **Vonau® Vet** é uma solução de incolor a levemente amarelada com odor característico de menta.

Cuidados de conservação

Conservar em local seco, em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em casos de ingestão acidental, procure um médico e leve a embalagem do produto. Depois de aberto, válido por 3 meses.

Partida, fabricação e vencimento: vide embalagem.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento sob nº SP 001692-6.000004 em 31/07/2021.

Proprietário e fabricante:

Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. – Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 1039

Bragança Paulista (SP) - CEP: 12929-600

CNPJ: 49.475.833/0018-46 - SAC: 0800 941 5566

Responsável técnica: Daniela Ziolkowski, CRF-SP 29.486.

Vencimento: 24 meses após a data de fabricação.

Depois de aberto, válido por 3 meses.